



EXTENSIVO FERTIPRADO



***Prados
de Longa
Duração***

FERTIREG





Características

- Rigorosa selecção de sementes de leguminosas e gramíneas anuais e perenes, com elevada capacidade de ressemeiteira
- Permite carga animal elevada, ajustada à capacidade produtiva

Razões para semear

- Produção em quantidade e qualidade 3 a 5 vezes superior à da pastagem existente
- Pode ser pastoreado durante todo o ano, apesar do pico da produção de erva ocorrer na Primavera
- Produção de erva de qualidade durante muitos anos, quando bem instalado e manejado


Maneio do EXTENSIVO FERTIPRADO 1º ano

- Pastoreio por curtos períodos de tempo*, 2 a 3 meses após a sementeira (azevém com 5 a 7 folhas), com elevada carga animal de forma a controlar as infestantes
- Retirar os animais do prado no início da floração de forma a garantir uma elevada produção de semente
- O prado deve ser intensamente pastoreado depois de seco, o que favorecerá a sua regeneração no Outono seguinte

* Sempre que as condições do solo o permitam

2º ano e seguintes

- Deixar o prado em repouso nas primeiras 2/3 semanas após as primeiras chuvas de Outono para favorecer o estabelecimento das plantas
- Após este período, o pastoreio pode ser contínuo, intermitente ou rotacional com carga animal ajustada à capacidade produtiva
- No Verão, quando o prado estiver seco, deve ser consumido o mais possível pelos animais, de modo a que aquando das primeiras chuvas de Outono o pasto seco tenha sido bem removido
- Nestes prados as leguminosas conseguem fixar 100 kg/ha/ano de azoto atmosférico, não se recomenda por isso a utilização de adubos azotados



	PB (%)	DMS (%)	UFL /kg MS	MS (t/ha)
Qualidade e produção	8-26	50-80	0,55-1,00	4-10

▪ PB . Proteína bruta
▪ DMS . Digestibilidade da matéria seca

▪ UFL . Unidades forrageiras leite
▪ MS . Matéria seca

ÉPOCA IDEAL DE SEMEITEIRA	DENSID. DE SEMEITEIRA (KG/HA)	PREPARAÇÃO DO TERRENO	SEMEITEIRA	ADUBAÇÃO INDICATIVA DE FUNDO (UNID./HA)	ADUB. INDICATIVA DE COBERTURA (UNID./HA)
Setembro/Outubro	25-30	Terra bem desfeita e plana. Profundidade aconselhada de 10 cm (não fofa)	Profundidade da semente: 0,5 a 1 cm Rolagem recomendada com rolo dentado	Fósforo: 40 a 80 P ₂ O ₅ Potássio: 40 a 90 K ₂ O	Fósforo: 20 a 30 P ₂ O ₅

(Adubação mediante resultados da análise de solo)



Características

- Composta por leguminosas e gramíneas perenes (crescimento inicial mais lento)
- Permite utilização por pastoreio e eventualmente por corte

Razões para semear

- Excelente para pastoreio em períodos críticos
- Fonte permanente de proteína com elevada digestibilidade
- Potencia a recria e engorda de animais
- Aumenta a taxa de reprodução das fêmeas
- Em corte permite obter reservas forrageiras de excelente qualidade
- É a melhor alternativa de alimentação animal para explorações que disponham de água de rega

Maneio do FERTIREG 1º ano

- Por ser composto por plantas perenes, o prado tem crescimento inicial mais lento. Deve por isso ser iniciado o pastoreio 3 a 5 meses após a sementeira
- O primeiro corte (pastoreio ou mecânico) permite melhorar a homogeneidade da cultura e fazer o controlo de infestantes favorecendo a sua composição florística

2º ano e seguintes

- O repouso invernal entre meados de Novembro e Fevereiro aumenta a produção, equilíbrio e persistência do prado
- Para corte de feno ou silagem, deve manter-se a cultura em repouso até Maio de forma a obter uma produção forrageira elevada na altura do corte

Gama FERTIREG	
FERTIREG I	Solos ácidos a neutros
FERTIREG II	Solos férteis e regiões mais frescas e húmidas do Norte e Litoral da Península Ibérica
FERTIREG III	Solos neutros a alcalinos (argilo-calcáreos)
FERTIREG LIMITE DE ÁGUA	Variedades de gramíneas e leguminosas mais resistentes à seca. Boa produção, mesmo em situações de menor disponibilidade de água
FERTIREG VEADOS	Especialmente concebida para cervídeos. À base de variedades e espécies pelas quais os animais têm particular preferência
FERTIREG CAVALOS	Especialmente concebida para equinos, à base de gramíneas e reduzida quantidade de leguminosas
FERTIREG AUXILIO	Composta por variedades de leguminosas anuais de resesementeira e gramíneas perenes com dormência estival. Responde bem à rega de Primavera e início do Verão

	PB (%)	DMS (%)	UFL /kg MS	MS (t/ha)
Qualidade e produção	15-25	60-75	0,70-1,00	12-20

■ PB . Proteína bruta
■ DMS . Digestibilidade da matéria seca

■ UFL . Unidades forrageiras leite
■ MS . Matéria seca

ÉPOCA IDEAL DE SEMEITEIRA	DENSID. DE SEMEITEIRA (KG/HA)	PREPARAÇÃO DO TERRENO	SEMEITEIRA	ADUBAÇÃO INDICATIVA DE FUNDO (UNID./HA)	ADUB. INDICATIVA DE COBERTURA (UNID./HA)
Março/Abril Setembro/Novembro	25-35	Terra bem desfeita e plana. Profundidade aconselhada de 10 cm (não fofa)	Profundidade da semente: 0,5 a 1 cm Rolagem recomendada com rolo dentado	Fósforo: 40 a 90 P ₂ O ₅ Potássio: 40 a 100 K ₂ O	Fósforo: 40 a 70 P ₂ O ₅ Potássio: 40 a 60 K ₂ O

(Adubação mediante resultados da análise de solo)